

Méthodes à retenir :

- Avant de calculer des expressions de dérivées partielles, on justifie rapidement que les fonctions de 2 variables sont de classe \mathcal{C}^1 en ce point, sinon il faut revenir aux limites de taux d'accroissements.

I. Applications directes du cours

Exercice 1

Déterminer les ensembles de définition des fonctions suivantes. Lorsqu'elles existent, déterminer les dérivées partielles par rapport à x et à y de ces fonctions sur ces ensembles.

- 1) $f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$.
- 2) $g(x, y) = \ln(1 - xy)$.
- 3) $h(x, y) = x^y$.

Exercice 2

Soit f définie sur \mathbb{R}^2 par :

$f(x, y) = e^{x-y} + x^2$, et $A = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ fixé.

- 1) Déterminer le gradient de f en A . En déduire les extrema éventuels de f .
- 2) Déterminer la différentielle df_A de f en A .

Exercice 3

Déterminer une équation cartésienne de la tangente à la courbe d'équation $x^2 + 4y^2 = 1$ au point $M = (1; 0)$.

Exercice 4

Déterminer une équation cartésienne du plan tangent à la surface d'équation $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$ au point $A = (1; 0; 0)$.

Exercice 5

Résoudre l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + y \quad (E)$$

Exercice 6

Déterminer les éventuels points critiques des fonctions suivantes :

- 1) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = e^{x^2y}$.
- 2) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2y^2$.

II. Exercices

Exercice 7

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

- 1) Déterminer et représenter l'ensemble de définition D_f de f . Est-ce un ouvert, un fermé ?
- 2) Déterminer le plus grand ouvert Ω de \mathbb{R}^2 sur lequel f est de classe \mathcal{C}^1 .
- 3) Déterminer les éventuels points critiques de f .

Exercice 8

Posons

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xy - 1 \quad (1)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = x \quad (2)$$

1. Résoudre (1).
2. Résoudre (2).
3. Déterminer toutes les fonctions de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R}^2 vérifiant (1) et (2).

Exercice 9

- 1) Rappeler la définition d'un maximum local pour une fonction de deux variables à valeurs dans \mathbb{R} .
- 2) Déterminer les éventuels extrema de la fonction f définie sur \mathbb{R}^2 par : $f(x, y) = e^x + e^y + e^{-x-y}$.

Exercice 10

Soient $g = f \circ \varphi$, avec $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \mathbb{R}$, et $\varphi : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(r, \alpha) \mapsto (r \cos \alpha, r \sin \alpha)$

- Exprimer, pour $A \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $\frac{\partial g}{\partial r}(A)$, $\frac{\partial g}{\partial \alpha}(A)$ et $\frac{\partial g}{\partial z}(A)$ à l'aide de $\frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(A))$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(A))$.
- Application $f : (x, y) \mapsto \cos(xy) e^y$, $A = (1, 2)$.

Exercice 11

Résoudre sur \mathbb{R}^2 l'équation aux dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - 3 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$

via le changement de variable $\begin{cases} u = 2x + y \\ v = 3x + y \end{cases}$

Exercice 12

En réalisant le changement de variables $\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases}$ déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^2 solutions de l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$$

Exercice 13

En réalisant le changement de variables $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$

résoudre :
(E) : $x \frac{\partial f}{\partial x}(\cdot, \cdot) + y \frac{\partial f}{\partial y}(\cdot, \cdot) = 0$.

III. Pour aller plus loin

Exercice 14

Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x > 0\}$, on cherche les fonctions f de classe \mathcal{C}^1 de A vers \mathbb{R} telles que pour tout (x, y) de A , l'équation aux dérivées partielles suivante soit vérifiée :

$$(E) : x \frac{\partial f}{\partial x}(\cdot, \cdot) + y \frac{\partial f}{\partial y}(\cdot, \cdot) = 0.$$

- Soit $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, vérifier que $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}$, définie par : $\varphi(x, y) = g(y/x)$ est solution de (E);
- Démontrer que si f vérifie (E) alors $f(u, uv)$ ne dépend que de v ;
- conclure.

Exercice 15

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^6}{x^6 + (x^2 - y)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées partielles en tout point A de \mathbb{R}^2 et les déterminer. f est-elle pour autant de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}^2 ?

Exercice 16

Equation des cordes vibrantes

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \quad (E)$$

L'équation (E) appelée équation des ondes unidimensionnelle (ou équation de D'Alembert) décrit le mouvement d'une corde soumise à des vibrations transversales se propageant à une vitesse $c > 0$ le long de la corde (propagation d'une onde transverse le long de l'axe (Ox)). Notons $L > 0$ la longueur de la corde.

On souhaite ainsi résoudre l'équation aux dérivées partielles (E) d'inconnue $u : [0, L] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de

classe \mathcal{C}^2 avec conditions initiales $u(0, t) = u(L, t) = 0$.

1) En réalisant le changement de variables

$$\begin{cases} x = y + s \\ t = \frac{-y}{c} + \frac{s}{c} \end{cases}$$

montrer que $v : (y, s) \mapsto u\left(y + s, \frac{-y}{c} + \frac{s}{c}\right)$ vérifie

$$\text{l'EDP : } \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial s} = 0 \quad (2)$$

2) En déduire qu'il existe deux fonctions $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^2 telles que v soit de la forme

$$v : (y, s) \mapsto g(2y) + h(2s)$$

3) En déduire que u est de la forme

$$u : (x, t) \mapsto g(x - ct) + h(x + ct)$$

Exercice 17 un problème d'optimisation

Un industriel souhaite produire une boîte de chocolat cylindrique à base triangulaire équilatérale de volume V donné tout en minimisant la quantité de carton employé. Déterminer la longueur du côté ℓ de la base et la hauteur h d'une telle boîte.

Exercice 18

En passant en coordonnées polaires, déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_*^+ \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 solutions de l'équation aux dérivées partielles

$$y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} = f$$

Exercice 19 Mines

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Trouver les $f \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^{+*}, \mathbb{R})$ telles que

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \alpha f$$

Exercice 20 Ligne de plus grande pente

Soit $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto h(x, y)$ de classe C^1 , et la surface paramétrée $\mathcal{S} = \{(x, y, h(x, y))\}$.

Soit $A_0 = (x_0, y_0)$ un point du plan, et $B_0 = (x_0, y_0, h(x_0, y_0))$ le point correspondant sur la surface \mathcal{S} .

Soit $\vec{d} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j}$ un vecteur unitaire avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- Proposer une paramétrisation à vitesse constante $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto d(t)$ de la droite \mathcal{D} passant par A_0 et dirigée par \vec{d} .
- En déduire une paramétrisation $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto \gamma(t)$ de la courbe Γ contenue dans \mathcal{S} , dont la projection dans le plan (Oxy) est $t \mapsto d(t)$.
- En déduire que le vecteur vitesse de la courbe Γ en B_0 est $\vec{v} = (\alpha, \beta, \overrightarrow{Grad(h)}(A_0) \cdot \vec{d})$
- En déduire que $\|\vec{v}\|$ est maximal pour \vec{d} colinéaire à $\overrightarrow{Grad(h)}(A_0)$.
- Justifier l'affirmation de notre ami(e) physicien(ne) :
« Le gradient (de h) dirige la ligne de plus grande pente »

Exercice 21 Modélisation par moindres carrés

Etant donné un n échantillon de mesures physiques $((x_i, y_i))_{1 \leq i \leq n}$, on cherche à savoir si cet échantillon peut-être assimilé à des réalisations aléatoires de couples $((x_i, ax_i + b))_{1 \leq i \leq n}$, pour des paramètres a et b de régression linéaire, selon une relation linéaire de la forme

$$y = ax + b$$

- Par définition, la droite de régression linéaire associée à ces mesures est la droite d'équation $y = \hat{a}x + \hat{b}$, où $(\hat{a}, \hat{b}) \in \mathbb{R}^2$ est tel que

$$\delta_n(\hat{a}, \hat{b}) = \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{a}x_i - \hat{b}|^2 \text{ réalise le minimum}$$

$$\text{de la fonction } (a, b) \mapsto \sum_{i=1}^n |y_i - ax_i - b|^2.$$

- Justifier que résoudre ce problème revient à minimiser une quantité de la forme

$$(\star) \quad \|MV - Y\|_2^2$$

avec $M \in \mathfrak{M}_{n,2}(\mathbb{R})$ $V = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathfrak{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, et $W \in \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ à préciser.

- Que dire du projeté orthogonal \hat{Y} de Y sur le sous-espace vectoriel engendré par $\text{Im}(M)$? Etablir que $\hat{Y} = (M^T M)^{-1} M^T Y$.
- Justifier que ce maximum est atteint et est unique, à l'aide de la formule de projection sur un sous-espace vectoriel de dimension finie, muni d'une base orthonormée
- En déduire que l'équation de la droite des moindres carrés et obtenue pour des paramètres \hat{a} et \hat{b} que l'on explicitera en fonction des (x_i, y_i)

Exercice 22

On suppose que $f, g \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$, que $A \in \mathbb{R}^2$ et que $g(A) \neq 0$. Donner les formules pour

$$\nabla(fg)(A); \quad \nabla(f+g)(A); \quad \nabla\left(\frac{f}{g}\right)(A).$$

Notes

¹ correction : vrai, il suffit de transposer