


1. Force pressante sur le fond d'un récipient ☺


Pour une même hauteur d'eau et à surface de fond identique, comparer les forces de pression exercées sur les fonds des récipients A et B.



2. Mesure d'un masse volumique ☺

On place dans un tube en U, à gauche de l'huile de masse volumique ρ_1 et à droite de l'eau de masse volumique ρ .

On mesure $h_1 = 6\text{cm}$ la hauteur d'huile et $h = 5,2\text{cm}$ la hauteur d'eau. En déduire la masse volumique de l'huile en fonction de ρ , h et h_1 . puis faire l'application numérique.



3. Liquide dans un tube en U ☺☺


Un liquide de masse volumique ρ est contenu dans un tube en U de section S_1 à gauche et de section S_2 à droite.

On exerce une surpression ΔP du côté droit, le liquide descend alors d'une hauteur Δz .

1) Faire un schéma représentatif du déplacement Δz .

2) Déterminer une relation entre la quantité Δz_1 dont remonte le liquide du côté gauche, Δz , S_1 et S_2 .

3) Montrer que :
$$\Delta z_1 = \frac{\Delta P}{\rho g \left(1 + \frac{S_1}{S_2}\right)}$$



4. Tube en U fermé à une extrémité : transformation isotherme ☺☺☺

Un tube en U de section S est fermé à l'une de ses extrémités et ouvert à l'autre. Il contient du mercure et dans la branche fermée un volume $V = 100\text{cm}^3$ d'air assimilé à un gaz parfait. Le niveau du mercure dans la branche ouverte est plus bas que dans la branche fermée. La différence entre les 2 niveaux de mercure est $h = 20\text{cm}$. La pression extérieure est $P_0 = 10^5\text{Pa}$. La température T de l'air extérieur et de l'air emprisonné est constante.

On ajoute du mercure dans la branche ouverte jusqu'à ce que les 2 surfaces libres du mercure soient dans un même plan horizontal. On note ρ la masse volumique du mercure.

1. Faire un schéma du dispositif avant et après ajout du mercure .

2. Exprimer le volume V' occupé, après ajout, par l'air contenu dans la branche fermée en fonction de V , P_0 , ρ , g et h .

3. Déterminer le volume V_1 de mercure que l'on a ajouté en fonction de V , S , P_0 , ρ , g et h . Faire l'application numérique et donner le résultat en cm^3 .

Données: masse volumique du mercure: $\rho = 14\text{g.cm}^{-3}$, $S = 10\text{cm}^2$, $g = 10\text{m.s}^{-2}$.

Rep.:
$$V' = \left(1 - \frac{\rho g h}{P_0}\right) V \cdot V_1 = S h + 2 \times (V - V') = S h + 2 \frac{\rho g h}{P_0} V \cdot$$

5. Équilibre d'une cloche renversée sur l'eau ☺☺


On considère une cloche cylindrique, de section S , de hauteur h et de masse m , contenant initialement un volume $V_0 = hS$ d'air à la température T_0 , sous la pression atmosphérique P_0 .

On renverse cette cloche dans une cuve remplie d'eau, de masse volumique ρ constante. Elle s'enfonce dans l'eau en emprisonnant la quantité d'air initialement contenue dans le volume V_0 .

On suppose qu'elle se stabilise et flotte comme indiqué ci-contre.

On fait les hypothèses suivantes :

- L'air est un gaz parfait
- La pression de l'air est uniforme
- La température de l'air est constant, égale à T_0 , à l'intérieur de la cloche, au cours de la transformation.
- L'épaisseur des parois de la cloche est supposée très faible de telle sorte qu'on négligera la poussée d'Archimède sur la cloche.



1. On cherche à établir 3 équations reliant x , y , et P la pression de l'air sous la cloche, pour cela :

- 1.1. Traduire l'équilibre mécanique de la cloche.
- 1.2. Appliquer la loi fondamentale de l'hydrostatique.
- 1.3. Utiliser l'équation d'état des gaz parfaits.

2. En déduire les expressions des hauteurs x et y en fonction de P_0 , S , m , g , h et ρ .

3. Déterminer la condition à vérifier par le volume V_0 de la cloche, pour que celle-ci puisse effectivement flotter.

6. Étude d'un manomètre différentiel ☺☺

Un manomètre différentiel est constitué de deux récipients cylindriques, de sections droites respectives S_1 et S_2 , reliés par un tube de section intérieure s constante.

L'ensemble contient deux liquides non miscibles de masses volumiques μ_1 et μ_2 .

1) Initialement, la pression au-dessus des deux liquides est la même et égale à P_0 , H_1 et H_2 sont définis à partir de la surface de séparation des deux liquides. En déduire une relation entre μ_1 et μ_2 , H_1 et H_2 .

2) On provoque au dessus du liquide 1 une surpression ΔP et la surface de séparation des 2 liquides se déplace de Δh .

2.1. Faire un schéma clair sur lequel apparaît Δh , ainsi que les hauteurs:

• Δx dont descend le liquide 1 et Δz dont monte le liquide 2.


• H'_1 et H'_2

2.2. Exprimer Δx et Δz en fonction de Δh , S_1 , S_2 et s .

2.3. Exprimer les nouvelles hauteurs H'_1 et H'_2 en fonction de H_1 , H_2 , Δh , Δx et Δz . En déduire que l'expression littérale de la

sensibilité est :
$$\frac{\Delta h}{\Delta P} = \frac{1}{g \left(\mu_2 \left(\frac{s}{S_2} + 1 \right) + \mu_1 \left(\frac{s}{S_1} - 1 \right) \right)}$$
 puis faire l'application numérique.

Données: $\mu_1 = 998 \text{ kg.m}^{-3}$; $\mu_2 = 1024 \text{ Kg.m}^{-3}$; $S_1 = S_2 = 100 \text{ s}$; $g = 9,81 \text{ ms}^{-2}$



7. Double vitrage ☺

Un double vitrage est constitué de deux vitres séparées par de l'air emprisonné à la pression atmosphérique du lieu de fabrication, qui se trouve au niveau de la mer : $P_0 = 1,013 \text{ bar}$. Il ne peut pas résister à un écart relatif entre la pression intérieure et la pression extérieure supérieur à 10%.

En supposant que l'air atmosphérique suit la loi de l'équilibre de l'atmosphère isotherme, jusqu'à quelle altitude maximale h_{max} peut-il être transporté sans risque à 0°C ?

Données: intensité de la pesanteur $g = 10 \text{ ms}^{-2}$; masse molaire de l'air $M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$; constante des gaz parfaits

$R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}\text{K}^{-1}$.

8. Stratosphère et troposphère ☺☺

La troposphère est la couche de l'atmosphère terrestre située au plus proche de la surface du globe jusqu'à une altitude d'environ 8 à 15 kilomètres, selon la latitude et la saison. En moyenne, la température diminue avec l'altitude, à peu près de $6,4^\circ\text{C}$ tous les 1000 mètres.

La stratosphère est la seconde couche de l'atmosphère terrestre, se situant au-dessus de la troposphère.

La troposphère considérée dans l'exercice a une altitude comprise entre 0 et 11000 m d'altitude, la température y varie linéairement avec l'altitude z suivant la relation : $T = a - bz$ où $a = 288 \text{ K}$ et $b = 6,5 \cdot 10^{-3} \text{ K.m}^{-1}$

La stratosphère est telle que $11000 \text{ m} \leq z \leq 25000 \text{ m}$. On peut y considérer la température constante telle que : $T = T_s = 216,5 \text{ K}$.

1) Établir la loi de variation de la pression en fonction de z dans la troposphère puis dans la stratosphère. On introduira la pression atmosphérique P_0 à l'altitude $z = 0$.

2) Quelle est la pression à 4700m d'altitude ?

Données : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$; $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; masse molaire de l'air : $M = 29,0 \text{ g.mol}^{-1}$

Élément de réponse : $P(z) = P_0 \left(\frac{a - bz}{a} \right)^{\frac{Mg}{Rb}}$ pour $z < 11000$.