

Table des matières

I. Premiers exemples	2
II. Continuité	2
III. Dérivabilité	3
IV. Intégrales à paramètre	5

Pré-requis

Objectifs

I. Premiers exemples

exemple 1 (Transformée de Fourier).

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\xi t} dt, \text{ pour } f \in L^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}).$$

\hat{f} est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} , on dominant par $\varphi : t \mapsto |f(t)|$

Par IPP $\hat{f}'(\xi) = i\xi \hat{f}(\xi)$

exemple 2 (Transformée de Laplace).

$$\mathcal{L}f(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt, \text{ pour } f \in L^1(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}).$$

II. Continuité

Théorème 1 (de continuité d'une intégrale à paramètre (admis, preuve non exigible)).

Soient I et J deux intervalles de \mathbb{R} , et $f : I \times J \rightarrow \mathbb{K}$, $(x, t) \mapsto f(x, t)$ telle que :

- i) pour tout $x \in I$, $f_{x, \bullet} : J \rightarrow \mathbb{K}$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur J ;
(f cont. p. morc. % à t)
- ii) pour tout $t \in J$, $f_{\bullet, t} : I \rightarrow \mathbb{K}$, $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur I ; (f continue % à x)
- iii) il existe une fonction $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, positive et intégrable sur J telle que :

$$\forall (x, t) \in I \times J, |f(x, t)| \leq \varphi(t)$$

(hypothèse de domination de $f(x, \bullet)$ par une fonction intégrable % à t)

Alors la fonction $g : I \rightarrow \mathbb{K}$, $x \mapsto \int_J f(x, t) dt$ est continue sur I .

Remarque 1. ii) et iii) assurent l'intégrabilité de $t \mapsto f(x, t)$, pour tout $x \in I$ fixé.

démonstration : (non exigible)

idée : pour (x_n) une suite réelle qui converge vers $x \in I$ fixé, on introduit la suite de fonctions (u_n) définie par :
 $\forall n \in \mathbb{N}, u_n : t \mapsto f(x_n, t)$.

La suite (u_n) est une suite de fonctions continues par morceaux sur J et intégrables, qui converge simplement vers $u : t \mapsto f(x, t)$, et telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in J, |u_n(t)| \leq \varphi(t)$, donc d'après le théorème de convergence dominée, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_J u_n(t) dt = \int_J u(t) dt$, i.e. $g(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} g(x)$. \square

Généralisation : domination locale compacte :

Lorsque l'hypothèse de domination de f est vérifiée sur toute partie de la forme $K \times J$ avec K segment de I , par une fonction φ_K , la conclusion reste vraie : g est alors continue sur tout segment K de I , donc sur I .

on peut remplacer iii) par l'hypothèse moins forte iii') :

iii') Pour tout segment $K = [u, v]$ de I , il existe une fonction $\varphi_K : J \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, positive et intégrable sur J telle que : pour tout $(x, t) \in [u, v] \times J$, $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$.

(hypothèse de domination sur tout segment K de I de $f(x, \bullet)$ par une fonction intégrable % t)

exemple 3. $g :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x} + (t^2+1)(2+\cos(t))} dt$

est continue.

Il suffit de considérer $\varphi : t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$.

exemple 4. $\Gamma :]0, +\infty[, x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$

Est continue, par domination pour $x \in [a, b]$ par $\varphi : t \mapsto \max(t^{a-1}e^{-t}, t^{b-1}e^{-t})$ continue positive intégrable.

III. Dérivabilité

Théorème 2 (de dérivation d'une intégrale à paramètre (admis, preuve non exigible)).

Soient I et J deux intervalles de \mathbb{R} , et $f : I \times J \rightarrow \mathbb{K}$, $(x, t) \mapsto f(x, t)$ telle que :

i) pour tout $x \in I$ la fonction $f_{x, \bullet} : J \rightarrow \mathbb{K}$ est continue par morceaux intégrable
 $t \mapsto f(x, t)$

sur J ;

ii) Pour tout $t \in J$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe \mathcal{C}^1 sur I ;

iii) pour tout $x \in I$ la fonction $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{x, \bullet} : J \rightarrow \mathbb{K}$ est continue par morceaux sur

$t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$

J ;

iv) il existe une fonction $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ positive, continue par morceaux et intégrable sur J telle que :

pour tout $(x, t) \in I \times J$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$.

(hypothèse de domination de $\frac{\partial f}{\partial x}(x, \bullet)$ par une fonction intégrable % t)

Alors la fonction $g : I \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \int_J f(x, t) dt$ est de classe \mathcal{C}^1 sur I et pour tout $x \in I$ on a

$$g'(x) = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

Remarque 2. iii) et iv) assurent l'intégrabilité de $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$, pour tout $x \in I$ fixé.

démonstration : (non exigible)

Soient $a \in I$, $T : x \mapsto \begin{cases} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} & \text{si } x \neq a \\ \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt & \text{si } x = a \end{cases}$

On va montrer que T est continue en a .

pour (x_n) une suite réelle qui converge vers $a \in I$ fixé sans jamais l'atteindre, on a par linéarité :

$$T(x_n) = \int_J h_n(t) dt, \text{ où } h_n : t \mapsto \frac{f(x_n, t) - f(a, t)}{x_n - a}$$

La suite (h_n) est une suite de fonction continues par morceaux, elle converge simplement vers $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ (par définition des dérivées partielles).

Il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in [a - \eta, a + \eta]$, $|h_n(t)| \leq \|x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)\|_{\infty, [a-\eta, a+\eta]} \leq 2 \left| \frac{\partial f}{\partial x}(a, t) \right| + e^{-t^2} = \varphi(t)$, par inégalité des accroissements finis et continuité de $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$.

mais alors, d'après le TCD, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_J h_n(t) dt = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$, i.e. $T(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} T(a)$. \square

Généralisation : domination locale compacte :

Lorsque l'hypothèse de domination est vérifiée sur toute partie de la forme $K \times J$ avec K segment de I , par une fonction φ_K , la conclusion reste vraie !

Théorème 3 (de dérivations successives d'une intégrale à paramètre (admis, preuve non exigible)).

Soient I et J deux intervalles de \mathbb{R} , k un entier naturel, et $f : I \times J \rightarrow \mathbb{K}$, $(x, t) \mapsto f(x, t)$ telle que :

- i) pour tout $x \in I$ la fonction $f_{x, \bullet} : J \rightarrow \mathbb{K}$ est continue par morceaux intégrable sur J ;
 $t \mapsto f(x, t)$
- ii) Pour tout $t \in J$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe \mathcal{C}^k sur I ;

- iii) pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$ et tout $x \in I$ la fonction $\left(\frac{\partial^i f}{\partial x^i}\right)_{x, \bullet} : J \rightarrow \mathbb{K}$ est continue par morceaux sur J ;
 $t \mapsto \frac{\partial^i f}{\partial x^i}(x, t)$

- iv) il existe une fonction $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ positive, continue par morceaux et intégrable sur J telle que :
pour tout $(x, t) \in I \times J$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$.
(hypothèse de domination de $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, \bullet)$ par une fonction intégrable % t)

Alors la fonction $g : I \rightarrow \mathbb{K}$, $x \mapsto \int_J f(x, t) dt$ est de classe \mathcal{C}^k sur I et pour tout $x \in I$ on a

$$g^{(i)}(x) = \int_J \frac{\partial^i f}{\partial x^i}(x, t) dt, \forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket.$$

démonstration : par récurrence sur $k \geq 1$. \square

Programme PC :

IV. Intégrales à paramètre

CONTENUS

CAPACITÉS & COMMENTAIRES

Intégrales à paramètre

Théorème de continuité :

Si I et J sont deux intervalles de \mathbb{R} et f une fonction définie sur $I \times J$, telle que :

- pour tout $x \in I$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur J ;
- pour tout $t \in J$, $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur I ;
- il existe une fonction φ positive, continue par morceaux et intégrable sur J , telle que pour tout $(x, t) \in I \times J$, on ait $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$;

alors la fonction $x \mapsto \int_J f(x, t) dt$ est continue sur I .

Théorème de dérivation : Si I et J sont deux intervalles de \mathbb{R} et f une fonction définie sur $I \times J$, telle que :

- Pour tout $x \in I$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur J ;
- Pour tout $t \in J$, $x \mapsto f(x, t)$ est de classe \mathcal{C}^1 sur I ;
- Pour tout $x \in I$, $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur J ;
- Il existe une fonction φ positive, continue par morceaux et intégrable sur J , telle que pour tout $(x, t) \in I \times J$, on ait $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$;

alors la fonction $g : x \mapsto \int_J f(x, t) dt$ est de classe \mathcal{C}^1 sur I et on a sur I :

$$g'(x) = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

Extension aux fonctions de classe \mathcal{C}^k .

Démonstration non exigible.

Adaptation au cas où l'hypothèse de domination est vérifiée sur tout segment de I .

Démonstration non exigible.

Adaptation au cas où l'hypothèse de domination est vérifiée sur tout segment de I .

\Leftrightarrow PC : transformée de Fourier.