

Correction des exercices du chapitre 5

1 Applications directes du cours

Exercice n° 1

fonction $f(x) =$	$\cos x$	$\sin x$	$\frac{1}{x}$	x^α ($\alpha \neq 1$)	$\frac{1}{1+x^2}$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$
1. primitive $F(x) =$	$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$\ln x $	$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$	$\arctan(x)$	$2\sqrt{x}$
Intervalle	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^{+*}$	

u est systématiquement une fonction dérivable sur son domaine de définition $\mathcal{D}_u$. Pour certains cas, il y a des contraintes supplémentaires :

$f =$	uu'	$u'u^n$	$\frac{u'}{u}$	$\frac{u'}{u^2}$	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$u' \sin(u)$
$F =$	$\frac{1}{2}u^2$	$\frac{1}{n+1}u^{n+1}$	$\ln u $	$\frac{1}{u}$	$2\sqrt{u}$	$-\cos(u)$
			u ne s'annule pas	u ne s'annule pas	u ne s'annule pas	

- $y' = 2x + e^x$ a pour solutions les fonctions de la forme $f(x) = x^2 + e^x + k$ où $k \in \mathbb{R}$. On travaille sur l'intervalle $\mathbb{R}$.
 - $y' = \frac{1-x}{x^2} \iff y' = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}$ a pour solutions les fonctions de la forme $f(x) = \frac{1}{x} - \ln|x| + k$ où $k \in \mathbb{R}$. On travaille sur les intervalles $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.
 - $7y' - \frac{1}{\sqrt{x}} = 3 \iff y' = \frac{1}{7\sqrt{x}} + \frac{3}{7}$ a pour solutions les fonctions de la forme $f(x) = \frac{2}{7}\sqrt{x} + \frac{3}{7}x + k$ où $k \in \mathbb{R}$. On travaille sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
 - $y' = t - t^2 + t^6$ a pour solutions les fonctions de la forme $f(t) = \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{7}t^7 + k$ où $k \in \mathbb{R}$. On travaille sur l'intervalle $\mathbb{R}$.
 - $y' = (5x+2)^7$ a pour solutions les fonctions de la forme $f(x) = \frac{1}{40}(5x+2)^8 + k$ où $k \in \mathbb{R}$. On travaille sur l'intervalle $\mathbb{R}$.
 - $y' = \tan(x) \iff y' = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ a pour solutions les fonctions de la forme $f(x) = -\ln|\cos(x)| + k$ où $k \in \mathbb{R}$. On travaille sur un intervalle de la forme $] -\frac{\pi}{2} + n\pi; \frac{\pi}{2} + n\pi[$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

- La primitive de $\ln$ qui s'annule en 1 est la fonction $x \mapsto \int_1^x \ln(t) dt$ où $x \in \mathbb{R}^{+*}$.

Calculons cette intégrale par parties, en posant $\begin{cases} u'(t) = 1 \\ v(t) = \ln(t) \end{cases}$. On a alors $\begin{cases} u(t) = t \\ v'(t) = \frac{1}{t} \end{cases}$ et :

$$\int_1^x \ln(t) dt = [t \ln(t)]_1^x - \int_1^x 1 dt = x \ln(x) - x + 1$$

- La fonction $x \mapsto x^2 e^x$ est définie, continue et strictement positive sur $[1; e]$, on a donc :

$$\int_1^e x^2 e^x dx > 0 \iff \int_e^1 x^2 e^x dx < 0.$$

- $\int_{-2}^1 3x^2 - x + 1 dx = [x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x]_{-2}^1 = \frac{27}{2}$
 - $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos(2t + \frac{\pi}{2}) dt = [\frac{\sin(2t + \frac{\pi}{2})}{2}]_0^{\frac{\pi}{6}} = -\frac{1}{4}$
 - $\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\text{Arctan}(t)]_0^1 = \frac{\pi}{4}$
- $f(x) = x \cos(x)$ est une fonction impaire donc $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x) dx = 0$.
 - On procède en faisant deux intégrations par parties successives :

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos(x) dx &= \underbrace{[x^2 \sin(x)]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}}_{=\frac{\pi^2}{2}} - 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) dx \\ &= \frac{\pi^2}{2} - 2 \left(-[x \cos(x)]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx \right) \\ &= \frac{\pi^2}{2} - 4 \end{aligned}$$

7. $I = \int_0^1 \frac{dx}{\operatorname{ch} x} = 2 \int_0^1 \frac{dx}{e^x + \frac{1}{e^x}}$. On pose $\phi(t) = \ln(t)$ et on obtient :

$$I = 2 \int_1^e \frac{1}{t + \frac{1}{t}} \times \frac{1}{t} dt = 2 \int_1^e \frac{dt}{t^2 + 1} = 2 [\operatorname{Arctan}(t)]_1^e = 2 \operatorname{Arctan}(e) - \frac{\pi}{2}$$

8. $x^2 y' = 3y - e^t \Leftrightarrow x^2 y' - 3y = -e^t$ est d'ordre 1, linéaire.

$(y - y')(2y + 1) = t \Leftrightarrow -2y'y - y' + 2y^2 + y = t$ est d'ordre 2, non linéaire.

$\cos(t)y'' = y - 1 \Leftrightarrow y'' \cos(t) - y = -1$ est d'ordre 2, linéaire.

$y'' = -y \Leftrightarrow y'' + y = 0$ est d'ordre 2, linéaire à coefficients constants.

9. • $y' + x^2 y = 0$. On travaille sur $\mathbb{R}$, on pose $a(x) = x^2$ et on prend $A(x) = \frac{1}{3}x^3$.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{x \mapsto \lambda e^{-\frac{1}{3}x^3} / \lambda \in \mathbb{R}\}$.

• $y' = \sqrt{x}y \Leftrightarrow y' - \sqrt{x}y = 0$. On travaille sur $\mathbb{R}^{+*}$, on pose $a(x) = -\sqrt{x}$ et $A(x) = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{x \mapsto \lambda e^{\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}} / \lambda \in \mathbb{R}\}$.

• $y' \cos(x) - y = 0 \Leftrightarrow y' - \frac{1}{\cos(x)}y = 0$. On travaille sur un intervalle de la forme $] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[$ (où $k \in \mathbb{Z}$), on pose $a(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ et $A(x) = \int_0^x a(t) dt$.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{x \mapsto \lambda e^{-A(x)} / \lambda \in \mathbb{R}\}$.

10. Résoudre les équations différentielles suivantes :

• On travaille sur $\mathbb{R}$. $y' - 5y = t + 3$ a pour équation homogène $y' - 5y = 0$ dont les solutions sont les fonctions de la forme $y(t) = \lambda e^{5t}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

On cherche une solution particulière affine, de la forme $f(t) = at + b$. On a :

$$(f \text{ est solution}) \Leftrightarrow f' - 5f = t + 3 \Leftrightarrow a - 5(at + b) = t + 3 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{5} \\ b = -\frac{16}{25} \end{cases}$$

Finalement, $f(t) = -\frac{1}{5}t + \frac{16}{25}$ est solution particulière et l'ensemble des solutions est

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto -\frac{1}{5}t - \frac{16}{25} + \lambda e^{5t} / \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

• On travaille sur $\mathbb{R}$. $2y' + y = e^{7t+1}$ a pour équation homogène $y' + \frac{1}{2}y = 0$ dont les solutions sont les fonctions de la forme $y(t) = \lambda e^{-\frac{1}{2}t}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

On cherche une solution particulière de la forme $f(t) = ke^{7t+1}$ avec $k \in \mathbb{R}$ à déterminer. On a :

$$(f \text{ est solution}) \Leftrightarrow 2f' + f = e^{7t+1} \Leftrightarrow 14ke^{7t+1} + ke^{7t+1} = e^{7t+1} \Leftrightarrow 15k = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{15}$$

Finalement, $f(t) = \frac{1}{15}e^{7t+1}$ est solution particulière et l'ensemble des solutions est

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \frac{1}{15}e^{7t+1} + \lambda e^{-\frac{1}{2}t} / \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

• On travaille sur $\mathbb{R}$. $y' + y = \sin(3t)$ a pour équation homogène $y' + y = 0$ dont les solutions sont les fonctions de la forme $y(t) = \lambda e^{-t}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

On cherche une solution particulière de la forme $f(t) = a \sin(3t) + b \cos(3t)$ avec a et b des réels à déterminer. On a :

$$\begin{aligned} (f \text{ est solution}) &\Leftrightarrow f' + f = \sin(3t) \Leftrightarrow (a - 3b) \sin(3t) + (3a + b) \cos(3t) = \sin(3t) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a - 3b = 1 \\ 3a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 3b = 1 \\ 10b = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{10} \\ b = -\frac{3}{10} \end{cases} \end{aligned}$$

Finalement, $f(t) = \frac{1}{10} \sin(3t) - \frac{3}{10} \cos(3t)$ est solution particulière et l'ensemble des solutions est

$$\mathcal{S} = \left\{ t \mapsto \frac{1}{10} \sin(3t) - \frac{3}{10} \cos(3t) + \lambda e^{-t} / \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

11. On travaille sur $\mathbb{R}$.

— Résolution de l'équation homogène : $(1 + x^2)y' + xy = 0 \Leftrightarrow y' + \frac{x}{1+x^2}y = 0$ a pour solution les fonctions de la forme $y(x) = \lambda e^{-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} = \frac{\lambda}{\sqrt{1+x^2}}$ où $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Recherche de solution particulière avec la méthode de la variation de la constante. Soit $f(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{1+x^2}}$ avec $\lambda(x)$ une fonction dérivable à trouver.
 f est solution de $(1+x^2)y' + xy = \sqrt{1+x^2}$ si, et seulement si :

$$(1+x^2)f'(x) + xf(x) = \sqrt{1+x^2} \Leftrightarrow (1+x^2) \frac{\lambda'(x)\sqrt{1+x^2} - \lambda(x)\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} + x \frac{\lambda(x)}{\sqrt{1+x^2}} = \sqrt{1+x^2}$$

$$\Leftrightarrow \lambda'(x)\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+x^2} \Leftrightarrow \boxed{\lambda'(x) = 1}$$

On prend $\lambda(x) = x$ et alors $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ est solution particulière de l'équation $(1+x^2)y' + xy = \sqrt{1+x^2}$.

- La solution générale de l'équation différentielle est : $\left\{ x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{\lambda}{\sqrt{1+x^2}} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.
 — Condition initiale : soit $g(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{\lambda}{\sqrt{1+x^2}}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ à déterminer. On a : $g(0) = 7 \Leftrightarrow \lambda = 7$.

Finalement, la solution de $(1+x^2)y' + xy = \sqrt{1+x^2}$ qui vérifie $y(0) = 7$ est $g(x) = \frac{x+7}{\sqrt{1+x^2}}$.

2 Vrai ou faux sur l'ensemble du chapitre

- a) Faux. Une fonction ayant une primitive en admet une infinité.
 b) Faux. Contre-exemple : $f(x) = x + \frac{1}{2}$ vérifie $\int_0^1 f(x)dx = 0$ et n'est pas nulle sur $[0; 1]$.
 c) Vrai. Par exemple, la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq \frac{1}{2} \\ -1 & \text{si } x < \frac{1}{2} \end{cases}$ ne s'annule jamais sur $[0; 1]$ mais vérifie $\int_0^1 f(x)dx = 0$.
 d) Faux. Contre-exemple : $f(x) = 1$ est strictement positive et $\int_1^0 f(x)dx = -\int_0^1 f(x)dx < 0$.
 e) Vrai. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe une fonction continue f telle que $\int_0^1 f^2(x)dx = 0$ et telle que f ne soit pas nulle sur $[0; 1]$. Cela signifie qu'il existe $a \in]0; 1[$ tel que $f(a) \neq 0$. Par continuité, il existe un intervalle $]a-h; a+h[\subset]0; 1[$ tel que f ne s'annule pas sur $]a-h; a+h[$. On a alors $\int_0^1 f(x)^2 dx \geq \int_{a-h}^{a+h} f(x)^2 dx \geq 2h \min\{f(x), a-h \leq x \leq a+h\}$.
 f) Vrai. L'équation $y' = 2x + 2$ convient.
 g) Vrai. $y' = y$ a pour solution $\{x \mapsto \lambda e^x, \lambda \in \mathbb{R}\}$.
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ donc si $\lambda \in \mathbb{R}^*$ alors $\lambda e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \pm\infty$ selon le signe de λ .
 Finalement $f(x) = 0$ est la seule solution de $y' = y$ qui vérifie $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.
 h) Vrai. Reprendre le cours si ça n'est pas clair.
 i) Faux. On a toujours une infinité de solutions si l'on n'a pas de condition initiale, une seule lorsqu'on a des conditions initiales.
 j) Vrai. Supposons que deux solutions d'une même EDO1 aient des courbes qui se croisent au point d'abscisse x_0 . Les fonctions sont de la forme $f(x) = \lambda e^{-A(x)}$ et $g(x) = \mu e^{-A(x)}$. On a :

$$f(x_0) = g(x_0) \Leftrightarrow \lambda e^{-A(x_0)} = \mu e^{-A(x_0)} \Leftrightarrow \lambda = \mu \Leftrightarrow f = g.$$

3 Un peu plus dur

Exercice n° 2

Cherchons des réels λ et μ tels que, pour $t \in \mathbb{R} \setminus \{1; -1\}$ on ait $\frac{\lambda}{1-t} + \frac{\mu}{1+t} = \frac{1+3t}{1-t^2}$.

$$\frac{\lambda}{1-t} + \frac{\mu}{1+t} = \frac{1+3t}{1-t^2} \Leftrightarrow \lambda(1+t) + \mu(1-t) = 1+3t \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda - \mu = 3 \\ \lambda + \mu = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 2 \\ \mu = -1 \end{cases}$$

On a donc, pour $t \in \mathbb{R} - \{1; -1\}$, $\frac{1+3t}{1-t^2} = \frac{2}{1-t} - \frac{1}{1+t}$.

On résout $y' = \frac{1+3t}{1-t^2}$ sur un intervalle inclus dans $\mathbb{R} \setminus \{1; -1\}$ par exemple $]1; +\infty[$. On a :

$$y' = \frac{1+3t}{1-t^2} \Leftrightarrow y' = \frac{2}{1-t} - \frac{1}{1+t} \Leftrightarrow y = -2 \ln|1-t| - \ln(1+t) + k \Leftrightarrow y = \ln \left(\frac{1}{(1-t)^2(1+t)} \right) + k$$

avec $k \in \mathbb{R}$.

Exercice n° 3

1. $F(0) = \int_0^0 f(t)dt = 0$.
2. — Pour $x \in [0 ; 4]$, $F(x)$ est une intégrale avec les bornes « dans le bon sens », on peut l'interpréter comme une aire algébrique. Comme la fonction intégrée est positive, c'est une quantité positive.
— Pour $x \in [-3 ; 0]$, pour $x \in [0 ; 4]$, $F(x)$ est une intégrale avec les bornes « dans le mauvais sens ». On a $F(x) = - \int_x^0 f(t)dt$. L'intégrale peut alors être interprétée comme une aire algébrique ; la fonction intégrée est négative donc l'intégrale est négative et $F(x)$ est positif.
3. Géométriquement, le triangle isocèle dont les sommets sont O , $A(2; 3)$ et $B(4; 0)$ est inscrit dans la surface entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses, délimitée par les droites $x = 0$ et $x = 4$. Les surfaces sont ordonnées : $6 \leq F(4)$.
De façon analogue, en inscrivant l'aire sous la courbe dans un rectangle, on a $F(4) \leq 12$.
4. On a $F' = f$ et donc on déduit les variations de F du signe de F : F est décroissante sur $[-3; 0]$ et sur $[4; 8]$; croissante sur $[0; 4]$.
Pour faire la figure, il faut ensuite respecter les contraintes vues dans les questions précédentes : variations, $F(0) = 0$, encadrement de $F(4)$.

Exercice n° 4

Il s'agit d'écrire les primitives cherchées à l'aide d'intégrales, puis de faire des intégrations par parties.

- La primitive de $f(x) = x^2 \ln(x)$ qui s'annule en 1 est définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $F(x) = \int_1^x t^2 \ln(t) dt$. On a :

$$F(x) = \left[\frac{1}{3} t^3 \ln(t) \right]_1^x - \frac{1}{3} \int_1^x t^2 dt = \frac{1}{3} x^3 \ln(x) - \frac{1}{9} x^3 + \frac{1}{9}$$

- La primitive de $f(x) = x \operatorname{Arctan}(x)$ qui s'annule en 0 est définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_0^x t \operatorname{Arctan}(t) dt$. On a :

$$F(x) = \left[\frac{1}{2} t^2 \operatorname{Arctan}(t) \right]_0^x - \frac{1}{2} \int_0^x \underbrace{\frac{t^2}{1+t^2}}_{=1 - \frac{1}{1+t^2}} dt = \frac{1}{2} (x^2 \operatorname{Arctan}(x) - x + \operatorname{Arctan}(x))$$

- La primitive de $f(x) = e^x \cos(x)$ qui s'annule en 0 est définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_0^x e^t \cos(t) dt$. On a :

$$F(x) = [e^t \cos(t)]_0^x + \int_0^x e^t \sin(t) dt = e^x \cos(x) - 1 + [e^t \sin(t)]_0^x - F(x)$$

On en déduit que $F(x) = \frac{1}{2} (e^x (\cos(x) + \sin(x)) - 1)$.

Remarque : dans ce dernier exemple, on aurait évité l'IPP en faisant apparaître des complexes.

Exercice n° 5

- a) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $x \mapsto x^n e^x$ est continue et donc intégrable sur $[0; 1]$, ce qui prouve l'existence de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n e^x (x - 1) dx$. La fonction intégrée est négative sur $[0; 1]$, les bornes sont dans le « bon sens », on en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I_{n+1} - I_n \leq 0$. Autrement dit la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- b) Avec le même raisonnement qu'à la question précédente on montre que $\forall n \in \mathbb{N}$, $I_n \geq 0$ et donc la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée, elle converge donc vers un certain réel $\ell \geq 0$.
- c) On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, I_{n+1} = [x^{n+1} e^x]_0^1 - (n+1) \int_0^1 x^n e^x dx = e - (n+1) I_n$$

- d) En passant à la limite, la relation $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$ est absurde pour $\ell \neq 0$, on en déduit $\ell = 0$.

Exercice n° 6

- a) La fonction $f : u \mapsto \frac{1}{3+e^{-u}}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$. Elle admet donc des primitives, l'expression donnée pour F est celle de la primitive de f qui s'annule en 0.
- b) Poser $t = e^u$ signifie faire le changement de variable $\varphi(t) = \ln(t)$. On a alors :

$$F(x) = \int_1^{e^x} \frac{1}{3 + \frac{1}{t}} \times \frac{1}{t} dt = \int_1^{e^x} \frac{1}{3t + 1} dt = \left[\frac{1}{3} \ln |3t + 1| \right]_1^{e^x} = \frac{1}{3} \ln(3e^x + 1) - \frac{\ln(4)}{3}$$

- c) Il suffit de dériver pour vérifier. L'expression trouvée pour $F(x)$ est celle d'une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = \frac{1}{3} \frac{1}{3e^x + 1} \times (3e^x) = \frac{1}{3 + \frac{1}{e^x}} = \frac{1}{3 + e^{-x}}$$

Exercice n° 7

- On fait le changement de variable $\varphi(t) = \sqrt{t} : \int_0^2 \frac{x}{x^4 + 1} dx = \int_0^4 \frac{\sqrt{t}}{t^2 + 1} \times \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \text{Arctan}(4)$.
- $\int_3^4 \frac{t+1}{t-2} dt = \int_3^4 1 + \frac{3}{t-2} dt = [t + 3 \ln |t-2|]_3^4 = 1 + 3 \ln(2)$.
- $\int_0^1 \frac{2}{(3t+6)^2} dt = 2 \left[-\frac{1}{3} (3t+6)^{-1} \right]_0^1 = -\frac{2}{3} \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{27}$.
- $\int_0^1 \frac{dt}{e^t + 1} = \int_1^e \frac{1}{u+1} \times \frac{1}{u} du = \int_1^e \frac{1}{u} - \frac{1}{u+1} du = [\ln(u) - \ln(u+1)]_1^e = 1 - \ln(e+1) + \ln(2)$.

Exercice n° 8

Il s'agit de procéder par la méthode de variation de la constante pour trouver les solutions particulières.

- Résolvons $(1+x^2)y' + 2xy = e^x + x$ sur $\mathbb{R}$.
L'équation homogène est $y' + \frac{2x}{1+x^2}y = 0$ a pour solution l'ensemble des fonctions de la forme $\frac{\lambda}{1+x^2}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.
Soit $\lambda(x)$ une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, notons $f(x) = \frac{\lambda(x)}{1+x^2}$. $f(x)$ est solution particulière de l'équation différentielle si, et seulement si :

$$\begin{aligned} (1+x^2)f'(x) + 2xf(x) &= e^x + x \iff \lambda'(x) - \frac{\lambda(x)2x}{1+x^2} + 2x \frac{\lambda(x)}{1+x^2} = e^x + x \\ &\iff \lambda'(x) = e^x + x \end{aligned}$$

On prend $\lambda(x) = e^x + \frac{1}{2}x^2$ et $f(x) = \frac{e^x + \frac{1}{2}x^2}{1+x^2}$ est solution particulière de l'équation.

Finalement, la solution générale de l'équation est $\left\{ x \mapsto \frac{e^x + \frac{1}{2}x^2 + \lambda}{1+x^2} / \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.

- Résolvons $\ln(x)y' + \frac{y}{x} = 1$ sur un intervalle contenu dans $]0; 1[\cup]1; +\infty[$.
L'équation homogène est $y' + \frac{1}{x \ln(x)}y = 0$, elle a pour solution l'ensemble des fonctions de la forme $\frac{\lambda}{\ln(x)}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.
Soit $\lambda(x)$ une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, notons $f(x) = \frac{\lambda}{\ln(x)}$. $f(x)$ est solution particulière de l'équation différentielle si, et seulement si :

$$\begin{aligned} \ln(x)y' + \frac{y}{x} &= 1 \iff \frac{\lambda'(x) \ln(x) - \lambda(x) \frac{1}{x}}{\ln(x)} + \frac{1}{x} \frac{\lambda(x)}{\ln(x)} = 1 \\ &\iff \lambda'(x) = 1 \end{aligned}$$

On prend $\lambda(x) = x$ et alors $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$ est solution particulière de l'équation.

Finalement, la solution générale de l'équation est $\left\{ x \mapsto \frac{x + \lambda}{\ln(x)} / \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.

Exercice n° 9

- a) La désintégration des noyaux radio-actifs correspond à une équation différentielle du type $y' = -ky$ où k est une constante positive qui dépend du noyau étudié.
Les solutions de cette équation sont de la forme $N(t) = N_0 e^{-kt}$ où N_0 est la quantité de noyau pour $t = 0$.
La demi-vie $\tau_{1/2}$ est le temps pris pour que le stock diminue de moitié. On a donc :

$$N(\tau_{1/2}) = \frac{1}{2}N_0 \iff N_0 e^{-k\tau_{1/2}} = \frac{1}{2}N_0 \iff k = \frac{\ln(2)}{\tau_{1/2}}$$

Dans cent ans, le stock sera de $N(100) = N_0 e^{-100k} = N_0 e^{-\frac{100 \ln(2)}{\tau_{1/2}}} \simeq 0,96N_0$.
La proportion du stock initial toujours présente sera approximativement de 96%.

- b) Soit $t_{0,1}$ le temps au bout duquel 90% du stock a disparu. On a :

$$N(t_{0,1}) = 0,1N_0 \iff N_0 e^{-kt_{0,1}} = 0,1N_0 \iff t_{0,1} = \frac{\ln(10)}{k}$$

D'après la valeur trouvée pour k on a $t_{0,1} = \frac{\ln(10) \ln(2)}{\tau_{1/2}} \simeq 5322$.

Il faudra donc attendre environ 5322 ans pour que 90% du stock ait disparu.

Exercice n° 10

- a) Dire que la cinétique est d'ordre 1 signifie que $[H_2O_2]$ satisfait l'équation différentielle $y' = -\lambda y$ où λ est une constante positive qui dépend des conditions expérimentales.
b) Les solutions de $y' = -\lambda y$ sont les fonctions de la forme $f(t) = ke^{-\lambda t}$ avec $k \in \mathbb{R}$.
Ici, on a $f(0) = 12,3$ donc on déduit $k = 12,3$ et donc $[H_2O_2] = 12,3e^{-\lambda t}$.
c) On a $\ln[H_2O_2] = \ln(12,3) - \lambda t$, c'est donc une fonction affine décroissante.
d) On place les points dans un repère orthonormé, on estime la pente de la droite sur laquelle ils sont alignés à $-0,002$, une valeur approchée de λ est donc $0,002$.
e) Le temps de demi-réaction $\tau_{1/2}$ est le temps au bout duquel la moitié du réactif a disparu. On a :

$$12,3e^{-\lambda\tau_{1/2}} = \frac{12,3}{2} \iff \tau_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

On a donc $\tau_{1/2} \simeq 346$ sec.

Exercice n° 11

Raisonnons par analyse-synthèse.

Supposons qu'il existe une fonction f continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, \int_0^x f(t) dt = f(x) + x : (\star)$.

En évaluant $\star$ en 0 il vient $f(0) = 0$.

D'autre part $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$ étant une primitive de f , c'est une fonction dérivable et puisque $(\star)$ est vérifiée, c'est aussi le cas de $f(x) + x$. On peut donc dériver $(\star)$ et il vient : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f'(x) + 1$.

f est donc la solution du problème de Cauchy $\begin{cases} y(0) = 0 \\ y' - y = -1 \end{cases}$, soit $f(x) = 1 - e^x$.

On vérifie que $f(x) = 1 - e^x$ est bien solution de $(\star)$.

4 Plus difficile...

Exercice n° 12

- a) $\forall t \in \mathbb{R}, 1 + \cos(t) = \operatorname{Re}(e^{i0} + e^{It}) = \operatorname{Re}\left(2 \cos\left(\frac{t}{2}\right)e^{i\frac{t}{2}}\right) = 2 \cos^2\left(\frac{t}{2}\right)$.

b) Faisons le changement de variable $\varphi(t) = \sin(t)$. On a :

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{1}{1 + \sqrt{1 - x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sqrt{1 - \sin(t)^2}} \times \cos(t) dt \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(t)}{1 + \cos(t)} dt && (\text{car } \cos(t) \geq 0 \text{ sur } [0; \frac{\pi}{2}]) \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 - \frac{1}{1 + \cos(t)} dt \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 - \frac{1}{2 \cos^2(\frac{t}{2})} dt \\
 &= \left[t - \tan\left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{\pi}{2} - 1
 \end{aligned}$$

Exercice n° 13

Soit $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$. Les intégrales $I = \int_0^x \frac{\cos(t)}{\cos(t) + \sin(t)} dt$ et $J = \int_0^x \frac{\sin(t)}{\cos(t) + \sin(t)} dt$ existent en tant qu'intégrales de fonctions continues sur des segments.

On a : $I + J = x$ et $I - J = [\ln(\cos(t) + \sin(t))]_0^x = \ln(\cos(x) + \sin(x))$.

On en déduit que $I = \frac{x + \ln(\cos(x) + \sin(x))}{2}$ et $J = \frac{x - \ln(\cos(x) + \sin(x))}{2}$.

Exercice n° 14

1. On travaille sur $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ sur lequel $\cos(x)$ ne s'annule pas. On a donc :

$$y' \cos(x) - y \sin(x) = \cos(x) \iff y' - \tan(x)y = 1$$

L'équation homogène a pour solutions les fonctions de la forme $x \mapsto \frac{\lambda}{\cos(x)}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Cherchons une solution particulière de la forme $f(x) = \frac{\lambda(x)}{\cos(x)}$ où $\lambda(x)$ est une fonction dérivable à déterminer. On a :

$$\begin{aligned}
 f' \cos(x) - f \sin(x) &= \cos(x) \iff \frac{\lambda'(x) \cos(x) + \lambda(x) \sin(x)}{\cos(x)} - \frac{\lambda(x)}{\cos(x)} \sin(x) = \cos(x) \\
 \lambda'(x) &= \cos(x)
 \end{aligned}$$

On prend $\lambda(x) = \sin(x)$ et la fonction $f(x) = \tan(x)$ est une solution particulière de $y' \cos(x) - y \sin(x) = \cos(x)$.

Finalement, $y' \cos(x) - y \sin(x) = \cos(x)$ admet pour solution $\left\{ x \mapsto \tan(x) + \frac{\lambda}{\cos(x)} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.

2. Les solutions de l'équation sont de la forme $y(x) = \frac{\sin(x) + \lambda}{\cos(x)}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Pour $x \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}$, $\cos(x) \rightarrow 0^+$ et donc, si le numérateur a une limite finie non nulle, le quotient tend vers $\pm \infty$ selon la règle des signes.

Pour avoir **peut-être** une limite finie en $\frac{\pi}{2}$ il faut que $\sin(x) + \lambda \rightarrow 0$ soit $\lambda = -1$. On a alors :

$$\frac{\sin(x) - 1}{\cos(x)} = \frac{\sin(x) - \sin(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} \times \frac{x - \frac{\pi}{2}}{\cos(x) - \cos(\frac{\pi}{2})} \xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin'\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \frac{1}{\cos'(\frac{\pi}{2})} = 0$$

Si $\lambda = -1$, $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} y(x) = -\infty$. En raisonnant comme en $\frac{\pi}{2}$, il faut que $\lambda = 1$ pour avoir une limite finie en $-\frac{\pi}{2}^+$ (cette limite est alors effectivement finie et vaut 0).

Finalement, il n'existe pas de solutions ayant des limites finies en $-\frac{\pi}{2}$ **et** en $\frac{\pi}{2}$.

On peut avoir une des deux limites qui est finie (elle vaut alors 0) en prenant $\lambda \in \{-1; 1\}$.

Exercice n° 15

Raisonnons par analyse-synthèse.

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f(-x) : (\star)$.

Par composition, $f : x \mapsto f(-x)$ est continue et dérivable, on en déduit que f est deux fois dérivable. En dérivant la relation $(\star)$ on a : $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = -f'(-x)$ et donc $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) = -f(x)$. On en déduit que $f(x)$ est de la forme $f(x) = A \cos(x) + B \sin(x)$ avec A, B des réels.

Soit $f(x) = A \cos(x) + B \sin(x)$ avec A, B des réels, on a $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = -A \sin(x) + B \cos(x)$ et $f(-x) = A \cos(x) - B \sin(x)$ donc f satisfait la relation $(\star)$ si, et seulement si, $A = B$.

Finalement, les fonctions cherchées sont les fonctions de la forme $f(x) = A(\cos(x) + \sin(x))$ avec $A \in \mathbb{R}$.

Exercice n° 16

L'équation (E) est non linéaire, on ne sait pas la résoudre directement.

Raisonnons par analyse-synthèse :

Supposons que f soit solution de (E) . De deux choses l'une :

- soit f est nulle ;
- soit il existe un intervalle I sur lequel f ne s'annule pas et alors, sur I on peut considérer $y = \frac{1}{f}$.

On a alors, $f' = -\frac{y'}{y^2}$ et :

$$f \text{ est solution de } (E) \iff -\frac{y'}{y^2} = \frac{1}{y} \left(1 - \frac{1}{y}\right) \iff y' = y - 1$$

On obtient que $y \in \{x \mapsto 1 + \lambda e^x, / \lambda \in \mathbb{R}\}$ et donc $f \in \{x \mapsto \frac{1}{1 + \lambda e^x} / \lambda \in \mathbb{R}\}$

On vérifie que la fonction nulle est que les fonctions $f(x) = \frac{1}{1 + \lambda e^x}$ sont bien solutions de (E) .

Remarque : qu'ai-je mis sous le tapis ?